


LAMMERSTERFTE IN BEELD

In de afgelopen tien jaar heeft GD 2.270 geitenlammeren pathologisch onderzocht. Deze factsheet geeft een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van sterfte.



36% van de sterfte werd veroorzaakt door infecties


24% van de onderzochte dieren **stierf prenataal**, door abortus, vroeggeboorte of aangeboren afwijkingen

26% van de ingezonden geitenlammeren heeft **luchtwegproblemen**

86% had een besmettelijke oorzaak

76% betrof een darmstoornis

24% van de ingezonden geitenlammeren lijdt aan **maag-, darm- en leverproblemen**



Prenatale sterfte: De meest voorkomende besmettelijke verwekkers waren resp. *Listeria* spp., *Chlamydia abortus* en *Toxoplasma gondii*. Meer informatie over abortusdiagnostiek: www.gddiergezondheid.nl/abortus.

Maag-, darm- en leverproblemen: *Clostridium perfringens* speelde op alle leeftijden een rol. Bij de jongste lammeren werden salmonellose en *Cryptosporidium parvum* vastgesteld. Oudere lammeren hadden vaker coccidiose en maagdarmwormen.

Luchtwegproblemen: De meeste inzendingen betrof diepere luchtweginfecties, meestal met de bacterie *Mannheimia haemolytica*.

Neurologische problemen: Op latere leeftijd kwamen neurologische problemen voor, zoals cerebrocorticale necrose (CCN) en hersen(vlies)ontsteking.

Locomotieproblemen: Gewrichtsontsteking en polyserositis werden het vaakst aangetoond.

Overige: Onbekende oorzaak of gerelateerd aan trauma of injectie.