

LAMMERSTERFTE IN BEELD

In de afgelopen tien jaar heeft GD 2.968 schapenlammeren pathologisch onderzocht. Deze factsheet geeft een overzicht van de meest voorkomende oorzaken van sterfte.

16%

van de ingezonden lammeren had een circulatieprobleem, veelal werd **bloedarmoede** vastgesteld

8%

van de ingezonden schapenlammeren is gestorven door **luchtwegproblemen**

29%


van de ingezonden schapenlammeren lijdt aan **maag-, darm- en leverproblemen**


76% betrof een darmstoornis

35%

van de onderzochte dieren **stierf prenataal**, door abortus, vroeggeboorte of aangeboren afwijkingen

43% van de sterfte werd veroorzaakt door een besmettelijke oorzaak





Prenatale sterfte: De meest voorkomende besmettelijke verwekkers waren resp. *Chlamydia abortus*, *Listeria* spp. en *Campylobacter* spp.. Meer informatie over abortusdiagnostiek: www.gddiergezondheid.nl/abortus.

Maag-, darm- en leverproblemen: *Clostridium perfringens* speelt op alle leeftijden een rol. Bij de jongste lammeren werden daarnaast coccidiose en *Strongylus* spp. vastgesteld. Oudere lammeren hadden ook last van leverbotziekte.

Luchtwegproblemen: De meeste inzendingen betrof diepere luchtweginfecties met de bacterie *Mannheimia haemolytica*.

Circulatieproblemen: Bloedarmoede kwam zowel bij jonge als bij oudere lammeren voor en werd veroorzaakt door *Haemonchus contortus*. Bij een derde van de oudere lammeren werd bovendien sepsis door *Bibersteinia trehalosi* aangetoond.

Overige: Onbekende oorzaak of gerelateerd aan trauma of injectie.