

Behandelinstructie UCD

Udder Cleft Dermatitis (UCD) is een ontsteking van de huid ter hoogte van de vooruier. De ernst van UCD varieert van mild tot ernstig. In milde gevallen is er sprake van (matige) aantasting van de huid, zoals roodheid, kaalheid, vochtophoping of kleine korstjes, maar is deze nog wel intact. In ernstige gevallen is de huid niet meer intact. De aanpak van ernstige UCD op melkveebedrijven begint met het tijdig herkennen en behandelen van milde gevallen. Het monitoren van de hele koppel is belangrijk om nieuwe gevallen op te sporen (zie hiervoor de [UCD scorekaart](#)). Door UCD gevallen adequaat te behandelen kunnen ernstige gevallen voorkomen worden. De locatie van de huid aantasting is moeilijk zichtbaar, daarom is het belangrijk om de genezing te monitoren met behulp van een spiegelkje op een stok of selfie stick.

De behandeling van UCD bestaat uit de volgende stappen:



1. Reinig de aangetaste huid met water en povidonjodiumoplossing /- shampoo. NB: gebruik hiervoor geen jodiumtinctuur! Verwijder al het vuil, haar en losse korsten die zich op en rond de wond bevinden. Probeer hierbij bloeden te voorkomen.



2. Dep de huid goed droog met een schone papieren doek.



3. Smeer vervolgens de wond en eventuele wondranden dagelijks in met een milde, niet vette wondzalf. Raadpleeg uw dierenarts voor een geschikt product.

Note: Er is voor ernstige UCD een zalf beschikbaar op basis van het enzym algino-gel waarvan een positief effect is aangetoond op het herstel van ernstige UCD (Van Werven et al., 2018)