



Rund

Checklist Salmonella-preventie

Als GD-klant ontvangt u hierbij een handig hulpmiddel. De Salmonella checklist geeft aan in hoeverre uw bedrijfsvoering insleep en verspreiding van nieuwe Salmonella-infecties voorkomt. Het is een waardevolle aanvulling om samen met uw dierenarts de juiste aanpak van Salmonella op uw bedrijf te bepalen.

Datum:

UBN:

Naam veehouder:

DAP-naam:

JA NEE NVT*

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐

Risicofactoren insleep

1. U koopt, weidt of stalt rundvee van bedrijven die geen 'Salmonella-onverdacht status' hebben.
2. U voert mest aan van andere veebedrijven (rundvee, varkens, pluimvee).
3. Op uw bedrijf worden varkens gehouden.
4. Oppervlaktewater wordt (wel eens) als veedrinkwater gebruikt (bijvoorbeeld in de weideperiode).
5. Uw rundvee heeft (zo nu en dan) contact met runderen van naburige bedrijven (bijvoorbeeld door over-de-draad contact, uitbreken, enz.).
6. Bezoekers dragen (soms) hun eigen werkkleding en schoeisel op uw bedrijf.
7. Eén of meer medewerkers op uw bedrijf werken ook op andere bedrijven.
8. Mestaanwendingsapparatuur en trekkers voor mestaanwending worden op uw bedrijf gebruikt zonder tevoren deugdelijk schoongemaakt te zijn.
9. Er vindt geen structurele bestrijding van ongedierte plaats.

Risicofactoren versleep

10. Kalveren worden niet (altijd) geboren in een volledig schone afkalfruimte.
11. De kalveren tot een half jaar oud zijn gehuisvest in dezelfde stalruimte als (een deel van de) volwassen runderen.
12. Na aanwenden van dierlijke mest worden weidepercelen (wel eens) gebruikt voor beweiding zonder dat deze tussendoor zijn gemaaid of een groeiperiode van 3 maanden hebben gehad.

Overige risicofactoren

13. Leverbot en/of BVD komen (mogelijk) voor op uw bedrijf.
14. De mineralenvoorziening van sommige diergroepen is (mogelijk) onvoldoende.

Antwoord	Salmonella-risico
Overal NEE	Zeer gering
Eén of twee JA's	Reëel risico
Drie of meer JA's	Risico groot

Checklist Salmonella-preventie

Loopt uw bedrijf risico?

Als uw bedrijf niet besmet is met Salmonella, dan is het vooral zaak de besmetting niet in te slepen van buiten het bedrijf. Heeft u de vragen 1 tot en met 9 op de voorzijde één of meer keren met 'JA' beantwoord, dan bestaat er een reëel tot groot risico van insleep.

Als er al een besmetting is, dan ligt het accent vooral op preventie van het verslepen van de infectie binnen uw bedrijf en het voorkomen van het ontstaan van dragers. Heeft u op de vragen 10 tot en met 14 op de voorzijde één of meer keren 'JA' geantwoord, dan bestaat er een reëel tot groot risico voor versleep of het ontstaan van dragers, zodat een bedrijfsbesmetting lange tijd kan voortduren.

Hoe kunt u het risico beperken?

U kunt het risico op Salmonella-insleep beperken door de risicofactoren, zoals die uit de vragen die u aan de voorzijde met 'JA' heeft beantwoord naar voren zijn gekomen, weg te nemen. Op uw bedrijf en in uw regio kunnen speciale risicofactoren een rol spelen. Het is verstandig de risico's van in- of versleep van Salmonella met uw eigen dierenarts te bespreken. Hij/zij weet als beste wat specifiek van belang is voor uw bedrijf en wat speelt in uw regio.

Hoe weet ik of mijn bedrijf besmet is?

Alleen letten op ziekteverschijnselen van een Salmonella-besmetting biedt onvoldoende zekerheid. Infecties verlopen geregeld zonder zichtbare ziekteverschijnselen. Tankmelkonderzoek op afweerstoffen tegen Salmonella is een heel gemakkelijke en eenvoudige manier om een indicatie te krijgen over de aanwezigheid van een infectie bij de melkkoeien. Een meer nauwkeurige methode is het onderzoek met de GD QuickScan Salmonella, omdat hierbij ook kalveren worden onderzocht. Informatie over deze onderzoeken vindt u op www.gddeventer.com

Een besmetting, en dan?

1. Voorkom besmetting van mensen.

Bij een (mogelijke) besmetting is het in de eerste plaats belangrijk dat er geen mensen besmet raken met Salmonella. Dat risico is het grootst bij rechtstreeks contact met besmette dieren. Neem daarom extra voorzorgsmaatregelen bij verzorging van zieke dieren of geboortehulp bij verwerpen. Houd er echter rekening mee dat Salmonella ook zonder zichtbare verschijnselen kan optreden. Dus persoonlijke hygiëne bij en na het verzorgen van de dieren is altijd van belang. Laat verzorging van de dieren niet uitvoeren door mensen die extra gevoelig zijn voor infecties (zwangere vrouwen, oude of heel jonge mensen en mensen met een verlaagde weerstand). Verder is het verstandig geen rauwe melk te (laten) drinken.

2. Isoleer en behandel zieke dieren

Het is verstandig dieren met ziekteverschijnselen te isoleren van de anderen en in overleg met uw dierenarts te behandelen. Gebruik bij de verzorging van zieke dieren aparte bedrijfskleding, laarzen en gereedschappen om versleep te voorkomen.

3. Voorkom dat andere dieren worden besmet

Het is verstandig maatregelen te nemen ter voorkoming van versleep vooral naar de jonge kalveren (zie de vragen 10 en 11 van de checklist op de voorzijde). Voorkom ook verontreiniging van biest en melk die aan de kalveren wordt verstrekt. Ons advies is alleen biest te geven van de eigen moeder en vervolgens over te gaan op kunstmelk.