

Weet u of er paratbc is op uw bedrijf?

Paratbc eenvoudig en voordelig bewaken en beheersen

Is er paratbc op uw bedrijf? Antwoord op deze vraag krijgt u met het GD Programma Paratuberculose. Het programma geeft op een betrouwbare en eenvoudige manier inzicht in de paratbc-situatie op uw bedrijf. Met onderzoek op afweerstoffen in bloed of melk stelt u de status van uw bedrijf vast om die vervolgens te bewaken en te beheersen. Met het Programma Paratuberculose krijgt u grip op paratbc.



Makkelijk en betaalbaar

Het GD Programma Paratuberculose is gebaseerd op individueel melk- of bloedonderzoek op afweerstoffen tegen paratbc, afvoer van besmette runderen en controle van aangevoerde runderen. Onderzoek op afweerstoffen is een betrouwbare, snelle en efficiënte manier om paratbc-besmette runderen op te sporen. Dit maakt het programma makkelijk en betaalbaar.

Melk- of bloedonderzoek

Individueel melk- of bloedonderzoek op afweerstoffen is de basis voor het bepalen van de status van uw bedrijf. Het Programma Paratuberculose kent drie statussen, één voor bedrijven waar geen paratuberculose is aangetoond en twee voor besmette bedrijven:

- Status A = geen paratbc aangetoond
- Status B = besmet, met afvoer besmette dieren
- Status C = besmet, zonder afvoer besmette dieren

Bewaken en beheersen

Als op uw bedrijf geen paratbc is aangetoond, hoeft u slechts eens per twee jaar een bewakingsonderzoek uit te voeren (individueel melk- of bloedonderzoek). Zo houdt u uw paratbc-status goed in de gaten. Is op uw bedrijf paratbc aangetoond, dan is het belangrijk de verspreiding van de bacterie in de gaten te houden en te stoppen. Daarvoor vindt jaarlijks bewakingsonderzoek via melk of bloed plaats. U kunt ook kiezen voor eens in de twee jaar mestonderzoek. Door preventieve maatregelen te nemen en de besmette runderen af te voeren pakt u de ziekte effectief aan. Om insleep van paratbc te voorkomen ontvangt u bij aanvoer van een rund een bericht met onderzoeksadvies.

Waarom deelnemen?

- Uw bedrijfsstatus voor paratbc kennen en bewaken;
- Belangrijkste besmettingsbronnen tijdig opsporen;
- Eenvoudig status bepalen met individueel melk- of bloedonderzoek.

Aanmelden

U kunt zich direct aanmelden voor het GD Paratuberculose Programma op www.gd-winkel.nl, of door te mailen naar info@gddiergezondheid.nl. Wilt u liever persoonlijk bestellen? Belt u dan met 0900-1770. Meer informatie over de aanpak van paratbc en het Paratuberculose Programma vindt u op www.gddiergezondheid.nl, of via 0900-1770.

Wat houdt het GD Programma Paratuberculose in?

- Eerste koppelonderzoek: individueel bloed- of melkonderzoek.
- Periodiek bewakingsonderzoek
Status A: 1x per 2 jaar, individueel melk- of bloedonderzoek
Status B en C: 1x per jaar, individueel melk- of bloedonderzoek óf 1x per 2 jaar individueel mestonderzoek
- Bericht en onderzoeksadvies bij aanvoer.

Neem nu maatregelen tegen paratbc

Voorkom insleep en verspreiding



Waarom zou ik nu maatregelen tegen paratbc nemen?

- Niets doen tegen paratbc betekent een grotere kans op gezondheidsproblemen door de ziekte;
- Ongemerkt veroorzaakt paratbc veel schade;
- Melkonderzoek maakt het gemakkelijk om uw bedrijfsstatus te bepalen en vervolgstappen te nemen;
- De (hygiëne)maatregelen tegen paratbc voorkomen ook andere ziekten.

Deelnemen? Meer informatie?

Belt u met 0900 - 1770. Of mail naar info@gddiergezondheid.nl.

De darmziekte paratuberculose komt op een groot aantal rundveebedrijven voor. De ziekte blijft lang onzichtbaar en zorgt voor grote schade. Het is daarom goed uw bedrijfsstatus te kennen en preventieve maatregelen tegen insleep en verspreiding te nemen.

Wat zijn de risico's van paratbc?

Paratuberculose (paratbc) is een besmettelijke darmziekte, die wordt veroorzaakt door de bacterie *Mycobacterium sub-species avium paratuberculosis*. Besmette dieren scheiden grote aantallen bacteriën uit via mest, melk en biest. Een klein beetje mest of melk van deze dieren is voldoende voor het overdragen van de infectie. Vooral kalveren (tot 1 jaar) zijn vatbaar voor een besmetting.

De belangrijkste oorzaken van verspreiding van paratbc zijn dan ook het directe contact tussen kalveren en besmette volwassen koeien en het contact van kalveren met mest van besmette volwassen koeien.

Verschijnselen: minder melk en slechte conditie

Runderen met paratbc ontwikkelen een ongeneeslijke darminfectie. Doordat de ziekte zich traag ontwikkelt, is hij moeilijk op te sporen. Een besmet rund gaat vaak pas verschijnselen vertonen op een leeftijd van drie tot zes jaar. Die verschijnselen zijn achtereenvolgens:

- Daling van de melkgift met tien tot twintig procent;
- Afnemende conditie, ondanks goede eetlust;

- Te laag geboortegewicht van de kalveren;
- Uiteindelijk aanhoudende diarree, verdere daling van de melkgift, vermagering en sterfte.

Hoe weet ik of mijn koeien paratbc hebben?

Is er paratbc op uw bedrijf? Antwoord op deze vraag krijgt u met het GD Programma Paratuberculose. Via melk- of bloedonderzoek spoort u een paratbc-besmetting op uw bedrijf op, waarna u maatregelen kunt nemen. Uw dierenarts kan u adviseren over de paratbc-aanpak op uw bedrijf.

Preventieve maatregelen belangrijk

Het voorkomen van insleep en verspreiding van de bacterie binnen uw koppel blijft de belangrijkste maatregel om vrij van paratbc te blijven of te worden. Verspreiding is te voorkomen door zo schoon mogelijk (mestvrij) te werken. Zorg er vooral voor dat kalveren zo weinig mogelijk in contact komen met mest van dieren die ouder zijn dan drie jaar. Koopt u runderen aan, vraag dan naar de paratbc-status van de koe of laat de runderen onderzoeken.

