



Bedrijfsbehandelplan klinische mastitis

Veehouder

Behandeling (neem eerst een melkmonster)

Wachttijden in dagen*

Milde mastitis

Vlokje in melk

Zieke koe met mastitis

Koorts

Ernstig zieke koe met mastitis

Sloom, hoge koorts

Bel uw dierenarts

Datum

Lees aandachtig de achterzijde voor meer informatie

* De aangegeven wachttijden zijn richtlijnen. Aan de geadviseerde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfsbehandelplan klinische mastitis

Verschuiven

Milde mastitis

- Zichtbaar afwijkende melk (vlokken)
- Kwartier soms afwijkend
- Geen koorts of lichte temperatuurverhoging (minder dan 40°C)
- Koe eet meestal normaal, is niet algemeen ziek
- Soms lichte afname in melkproductie

Zieke koe met mastitis

- Zichtbaar afwijkende melk
- Kwartier afwijkend/hard
- Koorts
- Onvoldoende eetlust
- Koe is lusteloos
- Afname melkproductie

Ernstig zieke koe met mastitis

- Koe is zeer sloom
- Koorts (meer dan 40°C)
- Koe is koud
- Koe eet niets meer
- Ernstige afname melkproductie/geen melk
- Sterk afwijkende (soms waterige) melk

Behandel tips

- Trek een kwartier met mastitis regelmatig uit.
- Neem altijd een melkmonster voordat u antibiotica toedient.
- Melk de koe helemaal uit voor u een injector inbrengt.
- Gebruik voor het inbrengen van de injector een desinfectiedoekje en gebruik daarna een tepeldip.

Diergeneesmiddeltips

- Maak de behandeling helemaal af, ook als de mastitis eerder genezen lijkt.
- Verander pas van diergeneesmiddel na overleg met uw dierenarts.
- Schakel bij twijfel altijd uw dierenarts in.

Algemene tips

- Neem van een koe met mastitis altijd de temperatuur op.
- Merk de koe duidelijk.
- Noteer de benodigde gegevens in uw dierziekeadministratie.



GEZONDE UIERS. MEER MELK.

