

Checklist salmonella op melkveebedrijven

Naam melkveehouder:	
UBN:	
Straat:	
Postcode en plaats:	
Naam dierenarts:	
UDN:	
Datum:	

1. Laatste 5 tankmelkuitslagen:

Antistoffen tegen salmonella aangetoond	Ja / Nee*	Ja / Nee*	Ja / Nee*	Ja / Nee*	Ja / Nee*	Laatste meting: Ja / Nee*
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------------

2. GD Programma Salmonella Onverdacht:

Deelnemer: Ja / Nee*
Status: Onbekend / In onderzoek / Observatie / Salmonella-Onverdacht*

3. Klinische verschijnselen salmonellose:

Verschijnselen van salmonellose zijn waargenomen:

Bij volwassen runderen:	Ja / Nee*	Periode van: / (mnd/jr)	tot: / (mnd/jr)
Bij jongvee:	Ja / Nee*	Periode van: / (mnd/jr)	tot: / (mnd/jr)

4. Bedrijfstype:

Aantal melkkoeien:	
Jongveeopfok:	Opfok op eigen bedrijf / Opfok op jongveebedrijf (1:1 relatie met uw bedrijf) / Opfok op jongveeopfokbedrijf waar ook rundvee van andere bedrijven staat / Geen opfok van eigen jongvee*
Overige diersoorten:	Zeugen / Vleesvarkens / Pluimvee / Schapen / Geiten / Overig, t.w. _____ *
Neventak:	Zelfzuivelaar / Zorgboerderij / Boerderijcamping / Overig, t.w. _____ *

5. Insleep van salmonella:

5.1 Er zijn het afgelopen jaar runderen op het bedrijf aangevoerd van bedrijven die niet de salmonella-onverdachtstatus hebben.	Ja / Nee*
5.2 Uw rundvee heeft contact met runderen van andere bedrijven (over-de-draad-contacten, keuringen).	Ja / Nee*
5.3 Iedere bezoeker maakt gebruik van bedrijfskleding en -laarzen van uw bedrijf.	Ja / Nee*
5.4 Een of meer medewerkers op uw bedrijf werken ook op andere bedrijven.	Ja / Nee*
5.5 Alle runderen worden via een afleverplaats afgevoerd.	Ja / Nee*
5.6 Er wordt dierlijke mest aangevoerd (rundvee, varkens, pluimvee).	Ja / Nee*
5.7 Oppervlaktewater wordt (wel eens) als veedrinkwater gebruikt (bijvoorbeeld in de weideperiode).	Ja / Nee*
5.8 Machines, vervoermiddelen en materialen komen altijd schoon, leeg en vrij van mest op het bedrijfsterrein.	Ja / Nee*

6. Verspreiding van salmonella rondom afkalven:	
6.1 De koeien kalven af in een aparte afkalfruimte.	Ja / Nee*
6.2 De afkalfruimte wordt uitsluitend voor afkalven gebruikt.	Ja / Nee*
6.3 Vóór elke geboorte worden de vloer en wanden van de afkalfruimte en alle geboortehulpmiddelen gereinigd.	Ja / Nee*
6.4 De koe komt schoon de afkalfruimte in.	Ja / Nee*
6.5 Wanneer hulp moet worden verleend bij de geboorte, wordt vlak voor het afkalven de achterhand van de koe gereinigd.	Ja / Nee*
6.6 De kalveren worden geboren op een schone ondergrond.	Ja / Nee*
6.7 De kalveren worden altijd direct bij de koe weggehaald.	Ja / Nee*
6.8 Het transitie-management (huisvesting en rantsoen rondom droogstand en afkalven) is recent (in de afgelopen drie maanden) geëvalueerd met uw voeradviseur en dierenarts.	Ja / Nee*

7. Verspreiding van salmonella bij kalveren tot 6 maanden:	
7.1 Kalveren worden individueel gehuisvest tot ze minimaal 21 dagen oud zijn.	Ja / Nee*
7.2 Kalveren krijgen uitsluitend biest van de eigen moeder.	Ja / Nee*
7.3 Kalveren krijgen (soms) mengbiest, koemelk, spoelwater of antibioticamelk.	Ja / Nee*
7.4 Kunstmelk wordt verstrekt met een drinkautomaat.	Ja / Nee*
7.5 Het drinkgerei wordt na elke voerbeurt gereinigd en met heet water nagespoeld.	Ja / Nee*
7.5 Kalveren krijgen al in de eerste week krachtvoer, ruwvoer en water.	Ja / Nee*
7.6 Ruwvoer wordt zodanig verstrekt dat besmetting met mest wordt voorkomen.	Ja / Nee*
7.7 De boxen voor individuele huisvesting worden na elk kalf gereinigd en ontsmet.	Ja / Nee*
7.8 Het leeftijdsverschil tussen het oudste en het jongste kalf in een groepshok is ten hoogste drie weken.	Ja / Nee*
7.9 Als eenmaal een groep is gevormd, worden de kalveren als groep verplaatst en het groepshok wordt na elke groep gereinigd.	Ja / Nee*
7.10 Kalveren worden tot 6 maanden leeftijd binnen gehuisvest, gescheiden van rundvee ouder dan een jaar.	Ja / Nee*
7.11 Er is mestcontact mogelijk tussen de stal met kalveren tot 6 maanden, en de stal(len) met ouder rundvee.	Ja / Nee*
7.12 Het jongvee op het bedrijf wordt verzorgd van jong naar oud.	Ja / Nee*
7.13 Bij de kalveren wordt aparte bedrijfskleding, schoeisel en gereedschap gebruikt.	Ja / Nee*

8. Verspreiding van salmonella bij ouder jongvee	
8.1 Jongvee tot 12 maanden oud is gescheiden gehuisvest van volwassen vee.	Ja / Nee*
8.2 Er is mestcontact mogelijk tussen de stal met kalveren tot 12 maanden en de stal met volwassen rundvee.	Ja / Nee*
8.3 Restvoer van het volwassen vee wordt aan jongvee gevoerd.	Ja / Nee*
8.4 Jongvee blijft permanent op stal of wordt uitsluitend geweid op etgroen.	Ja / Nee*
8.5 Aan drachtig jongvee worden altijd mineralen verstrekt.	Ja / Nee*

9. Verspreiding tussen verschillende diergroepen op uw bedrijf	
9.1 Tussen het uitrijden van mest op een perceel en beweiding van dat perceel wordt altijd een maaisnede gepland.	Ja / Nee*
9.2 Het drinkwater van jongvee staat in verbinding met de drinkbakken van runderen ouder dan twee jaar.	Ja / Nee*
9.3 Ongedierte wordt structureel bestreden.	Ja / Nee*

10. Weerstand tegen salmonella: andere infectieziekten	
10.1 Op uw bedrijf komt – voor zover bekend – leverbot voor.	Ja / Nee*
10.2 Op uw bedrijf wordt leverbot structureel bestreden.	Ja / Nee*
10.3 U neemt deel aan een BVD-programma. Zo ja, wat is uw status: Onbekend / In onderzoek / Observatie / Onverdacht / Vrij*.	Ja / Nee*
10.4 Op uw bedrijf wordt structureel tegen BVD gevaccineerd.	Ja / Nee*

11. Verspreiding van salmonella naar mensen	
11.1 Melk of melkproducten van uw bedrijf worden rauw geconsumeerd.	Ja / Nee*
11.2 Op uw bedrijf zijn of komen mensen met een verminderde weerstand (kleine kinderen, ouderen, zwangeren).	Ja / Nee*

Handtekening veehouder

Handtekening dierenarts